

8. A deviancia Magyarországon

Öngyilkosság

- A XX. század elejétől vannak pontos adataink
- Magyarország azóta a legnagyobb öngyilkossági gyakoriságú országok közé tartozik
- **Nagy emelkedési hullámok:**
 - 1.) 1860-1870-es évek
 - 2.) századforduló
 - 3.) 1930-as évek elején
 - 4.) 1954-1988
- Az öngyilkosok háromnegyede férfi
- A halállal végződő öngyilkosságok gyakorisága az életkorral együtt emelkedik
- Az öngyilkossági kísérletek száma legalább ötszöröse a haláleseteknek

Bűnözés

- **A két világháború közötti korszakig visszamenőleg vannak statisztikai adatok**
- **Az elítéltek száma nagymértékben függ a büntető jogtól és a bíróságok gyakorlatától**
- **1990 után növekedés**
lehetséges okok:
 - 1.) rendőrségi bűnüldözés lanyhulása
 - 2.) határok átjárhatóvá válása
 - 3.) szervezett bűnözés növekedése
 - 4.) állampolgárok tulajdonában levő vagyon megváltozása

Alkoholizmus

- Az alkoholisták számáról nincs pontos statisztikai adat.
- Becslés:
 - 1.) Jellinek-képlet (májzsugorodásban elhunytak számából)
 - 2.) Ledermann-képlet (egy főre jutó alkoholfogyasztásból)
- A májzsugorodás okozta halálesetek száma az 1950-es évek első felétől folyamatosan emelkedett.
- Az egy főre jutó alkoholfogyasztáson belül különösen a sör és az égetett szeszes italok fogyasztása nőtt nagyobb mértékben.
- Az egy főre jutó összes szeszesital-fogyasztás 1978 után stabilizálódott, a 80-as évek végétől kis mértékben csökkent.
- A nők és a fiatalok körében terjed.

Kábítószer-fogyasztás

Új jelenség Magyarországon, az 1960-as évek végén vette kezdetét (akkor elsősorban oldószerek, ragasztók)

- **1985. 14-18 éves fiatalok:**

- 1.) gimnáziumokban 1,0 %
- 2.) szakközépiskolákban 1,5 %
- 3.) szakmunkásképzőkben 2,0 %
- 4.) nevelőotthonokban 35,0%

- **1992. budapesti középfokú iskolai diákok 24,7 % próbálta**

- **„Ifjúság 2004.” 15-29 éves fiatalok 24 % próbálta**