

# Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 2.

Deutsch Krisztina  
szakoktató  
PTE ETK

# DROG FOGALMA

- ◆ Európai értelmezés: gyógyszerként használt szárított növényi részek, ritkán állati eredetű anyagok
- ◆ Amerikai értelemben: gyógyszer: természetes és szintetikus is.
- ◆ Narkotikum: központi idegrendszerre ható szerek.
- ◆ Mai értelemben: pszichoaktív, vagy pszichotróp szerek: kp. idegrendszeri hatásuk révén az ember közérzetét, hangulatát, viselkedését megváltoztatják.

# A DROGOK OSZTÁLYOZÁSA

## ◆ Hatás szerinti felosztás:

- Depresszánsok: terápiásan gátló hatású szerek. (nyugtatók, altatók, az etil-alkohol)
- Pszichostimulánsok: kir-re izgató hatásúak, anyagcserét fokozzák, növelik a teljesítményt. (kokain, crack, amfetamin, extasy)
- Hallucinogének: hallucinációt okozók: marihuana, LSD, extasy, gomba alkaloidok.
- Narkotikumok: Ópiátok. Morfin és származékai. Kábító fájdalomcsillapítók. Kifejezetten eufóriakeltő hatásúak.

## ◆ Eredet szerint:

- Természetes anyagok és származékaik: kokain, marihuána, nikotin, a mák alkaloidjai.
- Szintetikus szerek: heroin, amfetamin származékok, szerves oldószerek, nyugtatók, altatók.

# AZ ÓPIÁTOK I.

- ◆ Ópiát receptorokon kötődő molekulák (farmakológiaiilag):
  - *Máktea, nyers ópium, morfin, heroin (diacetilmorfin), Dolargan, Depridol.*
  - *Hatásuk: intenzív eufória a bódulatig, védettségérzet, önbizalom és önkontroll nő, a használó besztondul.*
  - *Használatuk: iv, orálisan, szippantva, gőzét belélegezve.*
  - *Tolerancia : igen erős. Heroin kezdő adag: 0.01 g-nál kevesebb, 1-2 éves használat: napi 1-2g. Máktea: 10-20 gubó > napi 200 gubó.*

# AZ ÓPIÁTOK II.

**Megvonás:** utolsó adag után 4-6 óra múlva már kezdődhet.

- 6-12 óra: könnyezés, ásítózás, rossz közérzet, orrfolyás.
- 12-14 óra múlva: étvágytalanság, nyugtalan alvás, hátfájdalom, tremor, hideg-meleg hullámok, izom és csontfájdalmak, hasi görcsök, hasmenés, hányás.
- Tünetek: 5. naptól csökkennek, 7-10 nap elmúlnak.
- Szorongás, depresszió a drogéhség kísérő tünetei.
- Elhúzódó tünetek: vegetatív idegrendszeri zavarok
  - 30 hétig vagy tovább.
- Terápia: bentfekvéses vagy ambuláns módon: nyugalom, megfelelő étkezés, gyógyszeres th.
- Heroin függőknél Methadonos elvonás.
- Halálozásuk: 2-4x nagyobb, mint az azonos korú átlagnépességnek.